

ご使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ビサコジル製剤の便秘治療薬

第2類医薬品

ドクソウガン ミニ

ドクソウガン ミニは、ビサコジルを主成分とした便秘治療薬です。ビサコジルは、結腸粘膜に作用し、大腸のぜん動運動を亢進して排便を促します。

1日1回就寝前又は空腹時に服用すると、およそ6～8時間ぐらいで効果があらわれます。

便秘は、大腸反射のぜん動運動が弱まって起る習慣性、常習性がほとんどで、偏った食事、運動不足、不規則な排便等いろいろな生活習慣が原因となったものです。

便秘が慢性化すると、吹出物、肌あれ、食欲不振などの症状があらわれます。

ドクソウガン ミニは、便秘、およびこれらの不快な諸症状を改善します。

使用上の注意

してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

1. 本剤を服用している間は、他の瀉下薬（下剤）を服用しないで下さい。
2. 大量に服用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
 - (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5)はげしい腹痛、悪心・嘔吐のある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2)1週間位服用しても症状がよくならない場合。
3. 下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：吹出物、肌あれ、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔、のぼせ、頭重。

用法・用量

成人15歳以上1回1～2錠。

1日1回就寝前又は空腹時にかまずに服用して下さい。

ただし、初回は1錠を用い、便通の具合や状態をみながら

1錠又は2錠を服用して下さい。

(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)本剤は腸溶錠ですので、かんだり、つぶしたりせずにそのまま服用して下さい。また制酸剤や牛乳により胃内で溶けてしまい、効果が弱まる場合がありますので、これらを飲んでから1時間以内の服用はさけて下さい。

*制酸剤…多くの胃薬に含まれている成分で、胃酸を中和する働きがあります。

(3)下図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

錠剤の取り出し方



成分・分量

ドクソウガン ミニ は、白色の腸溶性糖衣錠で1錠中ピサコジル6mgを含有しています。

添加物として結晶セルロース、乳糖、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、グリセリン脂肪酸エステル、沈降炭酸カルシウム、タルク、精製白糖、アラビアゴム末、精製ゼラチン、ショ糖脂肪酸エステル、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3)誤用の原因になったり品質が変わることがありますので、他の容器に入れ替えないで下さい。

(4)変質の原因になりますので、服用にならない錠剤は、裏のアルミ箔をきずつけないようにして下さい。

(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

※姉妹品として

服用量を、きめ細かく調節できる生薬の小さな丸剤「**複方毒掃丸**」生薬の良さを生かしながら、瀉下効果を高めた錠剤「**新ドクソウガンG**」服用し易い、成人用(15歳以上)の植物性の錠剤「**ドクソウガンE便秘薬**」がございますので是非お試しください。

製造販売元

 株式会社 **山崎帝國堂**

本 社

〒277-0863 千葉県柏市豊四季73番地1
〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目1番3号

お客様相談係

電話 04-7148-3412 代表
受付時間：9:00～16:30 (土、日、祝日を除く)

ホームページ

<http://www.dokusogan.jp>